



Grandes cultures

Le 24 Juin 1993

N° 6
 Supplément n° 2

MAIS

Pyrale : Intervenir entre le 28/06 et le 08/07.

MAIS

Stade : 8 à 13 Feuilles.

PYRALE
★ Situation

- En cage d'élevage à MARMILHAT (63) : Début du vol le 08/06.

Les sorties sont soutenues actuellement.

- Piégeages sexuels :

Le vol a débuté à SAINT-BABEL (63) le 19/06 et à LA FERTE-HAUTERIVE(03) le 20/06.

Aucune capture à ESPIRAT (63) et GANNAT (03) à ce jour.

★ Préconisation

Compte-tenu de nos observations, il faut prévoir d'intervenir avec les microgranulés dans la période du 28/06 au 08/07. Plusieurs insecticides microgranulés sont autorisés : consulter le dépliant SPV - AGPM. L'utilisation de pyréthrinoides liquides (autorisés sur Pyrale du Maïs) est susceptible d'induire le développement ultérieur des pucerons.

Les secteurs où un traitement se justifie sont répertoriés sur les cartes jointes. Globalement, il est recommandé d'intervenir :

- ALLIER : a) Le Val d'Allier : Zone de GANNAT, BELLENAVES, CONTIGNY, ST-LOUP, BILLY, VENDAT, BIOZAT.

b) La Forterre : CINDRE, TRETEAU.

c) Le Val de Loire : GANNAY-/LOIRE.


- PUY-DE-DOME :

a) La Limagne Nord.

b) Le secteur de BILLOM.

c) Les secteurs de SAINT-BABEL - ORBEIL.

CARTE ADMINISTRATIVE DE L'ALLIER



LEGENDE

Population larvaire > 1 larve/pied
TRAITEMENT IMPERATIF

Population larvaire 0,5 à 1 larve/pied
Traitement justifié en maïs semence
et maïs à haut potentiel (irrigué)


Population larvaire < 0,5 larve/pied
TRAITEMENT INUTILE

PYRALE DU MAIS

Automne 1992



PUY-DE-DOME



PYRALE DU MAÏS

Automne 1992

LEGENDE

- Population larvaire > 1 larve/pied
TRAITEMENT IMPERATIF
- Population larvaire 0,5 à 1 larve/pied
Traitement justifié en maïs semence
et maïs à haut potentiel (irrigué)
- Population larvaire < 0,5 larve/pied
TRAITEMENT INUTILE

